

Klinische Angaben Lymphknotenpathologie – Die Neue WHO-Klassifikation 2008:

- Fall 1:** 80 J., männlich, Beckenkammtrepanat. Klinisch V.a. Lymphom.
- Fall 2:** 43 J, männlich, cervicaler Lymphknoten, Lymphadenopathie, klinisch unklar, ob entzündlich oder neoplastisch.
- Fall 3:** 75 J., weiblich, klinisch Lymphadenopathie.
- Fall 4:** 49 J., männlich, submandibulärer Lymphknoten, Klinisch Lymphadenopathie.
- Fall 5:** 73 J. männlich, Biopsien Magen (nicht gezeigt) und Duodenum. Keine klinischen Angaben.
- Fall 6:** 69 J., weiblich, klinisch unklarer hämatomartiger Tumor am rechten Unterarm.
- Fall 7:** 8 J., weiblich, rechts inguinaler Lymphknoten, klinisch generalisierte Lymphadenopathie.
- Fall 8:** 25 J., männlich, axilläres Lymphknotenkonglomerat. Klinisch Lymphadenopathie.
- Fall 9:** 50 J., männlich, links cervikaler Lymphknoten. Klinisch Lymphadenopathie.
- Fall 10:** 54 J., männlich, generalisierte Lymphadenopathie und Splenomegalie. B-Symptomatik. CRP 126 mg/l. Leukozyten 9,5/nl, Erythrozyten 3,3 Mill/ μ l, Hb 9,6 g/dl.
- Fall 11:** 58 J., weiblich. 12cm i.D. Dünndarmkonglomerattumor mit Perforation des Jejunums und Infiltration der Mesenterialwurzel.
- Fall 12:** 77 J., männlich, links cervicaler Lymphknoten. Keine weiteren Angaben.
- Fall 13:** 71 J. männlich, Tumor in Oropharynx. Keine weiteren Angaben.
- Fall 14:** 83 J. weiblich, rechts cervicaler Lymphknoten. Keine weiteren Angaben.
- Fall 15:** 40-jähriger Patient, Lymphknoten aus dem Bereich der Glandula parotis. Beckenkamm tumorfrei.
- Fall 16:** 55 J. weiblich, Raumforderung im Nasenrachenraum.
- Fall 17:** 42 J. weiblich, mehrere cervikale Lymphknoten. Sonst keine vergrößerten Lymphknoten.
- Fall 18:** 77 J., männlich. 534g schweres, 16 x 10 x 4 cm großes Splenektomiepräparat (nicht gezeigt) und 1,4 cm großes Leberkeilexzisat.
- Fall 19:** 16 J. männlich, großer Mediastinaltumor mit Perikardinfiltration.
- Fall 20:** 24 J. männlich, cervikaler Lymphknoten. Großer Mediastinaltumor und obere Einflusstauung.