



INTERNATIONALE AKADEMIE FÜR PATHOLOGIE
DEUTSCHE ABTEILUNG e.V.
INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY
GERMAN DIVISION INC.

Klinische Angaben

Lehrserie Nr. 204

Nicht-epitheliale Tumoren im HNO-Bereich

von:

P. Möller, Ulm, 2010

Fallanamnesen:

Fall 01

Klinische Angaben:

Gaumentumor eines 2 Monate alten Knaben. Resektat.

Fall 01a

Klinische Angaben:

Gaumentumor eines 2 Monate alten Knaben. Resektat

Fall 01b

Klinische Angaben:

Gaumentumor eines 2 Monate alten Knaben. Resektat

Fall 02

Klinische Angaben:

39-jährige Frau

Unterkieferschmerzen mit röntgenologischem Bild, das an eine odontogene Zyste erinnert. Resektion. Frage des Kieferchirurgen: Follikuläre Zyste?

Fall 02a

Klinische Angaben:

39-jährige Frau

Unterkieferschmerzen mit röntgenologischem Bild, das an eine odontogene Zyste erinnert. Resektion. Frage des Kieferchirurgen: Follikuläre Zyste?

Fall 02b

Klinische Angaben:

39-jährige Frau

Unterkieferschmerzen mit röntgenologischem Bild, das an eine odontogene Zyste erinnert. Resektion. Frage des Kieferchirurgen: Follikuläre Zyste?

Fall 03

Klinische Angaben:

52-jähriger Mann

„ Glomustumor “ neben der A. carotis.

Fall 03a

Klinische Angaben:

52-jähriger Mann

„ Glomustumor “ neben der A. carotis.

Fall 03b

Klinische Angaben:

52-jähriger Mann

„ Glomustumor “ neben der A. carotis.

Fall 03c

Klinische Angaben:

52-jähriger Mann

„ Glomustumor “ neben der A. carotis.

Fall 03d

Klinische Angaben:

52-jähriger Mann

„ Glomustumor “ neben der A. carotis.

Fall 03e

Klinische Angaben:

52-jähriger Mann

„ Glomustumor “ neben der A. carotis.

Fall 04

Klinische Angaben:

Frau, 53-jährig,

mit einer unklaren Rauforderung des Frontobasis -nahen Nasennebenhöhlensystems beidseits. PEs.

Fall 05

Klinische Angaben:

Mann, 42-jährig,

bei dem vor einem Jahr ein Olfactoriusneuoblastom diagnostiziert worden war und der mittlerweile Halslymphknotenschwellungen entwickelt hatte.

Neck dissection bds..

Fall 06

Klinische Angaben:

Konsiliarfall: 48-jähriger Mann,

Kieferhöhlen- und Siebbeintumor.

Externe histopathologische Diagnose: Olfactorius -Neuroblastom.

Fall 06a

Klinische Angaben:

Konsiliarfall: 48-jähriger Mann,

Kieferhöhlen- und Siebbeintumor.

Externe histopathologische Diagnose: Olfactorius -Neuroblastom.

Fall 06b

Klinische Angaben:

Konsiliarfall: 48-jähriger Mann,

Kieferhöhlen- und Siebbeintumor.

Externe histopathologische Diagnose: Olfactorius -Neuroblastom.

Fall 06c

Klinische Angaben:

Konsiliarfall: 48-jähriger Mann,

Kieferhöhlen- und Siebbeintumor.

Externe histopathologische Diagnose: Olfactorius -Neuroblastom.

Fall 07

Klinische Angaben:

Mit 23 Jahren auswärtige Diagnose eines paravertebralen Askin-Tumors.

3 und 4 Jahre später Entfernung von Lungenmetastasen, 6 Jahre später

Rippenmetastasenentfernung mit Lungenteilresektion.

Im Lungengewebe kein Residualtumor, jedoch hiläre Lymphknotenmetastasen.

13 Jahre später: Nachweis einer Kieferhöhlenmanifestation eines Ewing-Sarkoms.

14 Jahre später: Verdacht auf weitere Metastasierung des bekannten Ewing-

Sarkoms. PEs von beiden Herden.

Fall 07a

Klinische Angaben:

Mit 23 Jahren auswärtige Diagnose eines paravertebralen Askin-Tumors.

3 und 4 Jahre später Entfernung von Lungenmetastasen, 6 Jahre später

Rippenmetastasenentfernung mit Lungenteilresektion.

Im Lungengewebe kein Residualtumor, jedoch hiläre Lymphknotenmetastasen.

13 Jahre später: Nachweis einer Kieferhöhlenmanifestation eines Ewing-Sarkoms.

14 Jahre später: Verdacht auf weitere Metastasierung des bekannten Ewing-

Sarkoms. PEs von beiden Herden.

Fall 08a

Klinische Angaben:

46-jähriger Mann mit endonasalem Tumor und zervikalen

Lymphknotenschwellungen.

PE aus der Nase (Präparat 8A) und diagnostische Lymphadenektomie (Präparat

8B).

Fall 08b

Klinische Angaben:

46-jähriger Mann mit endonasalem Tumor und zervikalen Lymphknotenschwellungen.

PE aus der Nase (Präparat 8A) und diagnostische Lymphadenektomie (Präparat

8B).

Fall 09

Klinische Angaben:

74-jähriger Mann mit einer unklaren Raumforderung in der linken Nasenhöhle.

Anamnestisch bekannt sind ein papilläres Schilddrüsenkarzinom und ein

Prostatakarzinom. Metastase? PEs.

Fall 09a

Klinische Angaben:

74-jähriger Mann mit einer unklaren Raumforderung in der linken Nasenhöhle.

Anamnestisch bekannt sind ein papilläres Schilddrüsenkarzinom und ein

Prostatakarzinom. Metastase? PEs.

Fall 09b

Klinische Angaben:

74-jähriger Mann mit einer unklaren Raumforderung in der linken Nasenhöhle.

Anamnestisch bekannt sind ein papilläres Schilddrüsenkarzinom und ein

Prostatakarzinom. Metastase? PEs.

Fall 09c

Klinische Angaben:

74-jähriger Mann mit einer unklaren Raumforderung in der linken Nasenhaupthöhle. Anamnestisch bekannt sind ein papilläres Schilddrüsenkarzinom und ein Prostatakarzinom. Metastase? PE´s.

Fall 09d

Klinische Angaben:

74-jähriger Mann mit einer unklaren Raumforderung in der linken Nasenhaupthöhle. Anamnestisch bekannt sind ein papilläres Schilddrüsenkarzinom und ein Prostatakarzinom. Metastase? PE´s.

Fall 10

Klinische Angaben:

83-jährige Frau

Tumor in der rechten unteren Nasenmuschel und im rechten Nasenboden. PEs.

Fall 11

Klinische Angaben:

Ohrmuscheltumor bei einem 30-jährigen Mann mit tuberöser Sklerose BournevillePringle.

Fall 12

Klinische Angaben:

Lippennahe Mundschleimhaut eines 15-jährigen Mädchens.

Fall 12a

Klinische Angaben:

Lippennahe Mundschleimhaut eines 15-jährigen Mädchens.

Fall 12b

Klinische Angaben:

Lippennahe Mundschleimhaut eines 15-jährigen Mädchens.

Fall 13

Klinische Angaben:

Fraglich benigner Parotistumor eines 66-jährigen Mannes.
Parotidektomie

Fall 13_1

Klinische Angaben:

Fraglich benigner Parotistumor eines 66-jährigen Mannes.
Parotidektomie

Fall 13a

Klinische Angaben:

Fraglich benigner Parotistumor eines 66-jährigen Mannes.
Parotidektomie

Fall 13b

Klinische Angaben:

Fraglich benigner Parotistumor eines 66-jährigen Mannes.
Parotidektomie

Fall 14

Klinische Angaben:

Schwellung der lingualen Seite der Epiglottis eines 65-jährigen Mannes. PEs.

Fall 14a

Klinische Angaben:

Schwellung der lingualen Seite der Epiglottis eines 65-jährigen Mannes. PEs.

Fall 14b

Klinische Angaben:

Schwellung der lingualen Seite der Epiglottis eines 65-jährigen Mannes. PEs.

Fall 14c

Klinische Angaben:

Schwellung der lingualen Seite der Epiglottis eines 65-jährigen Mannes. PEs.

Fall 14d

Klinische Angaben:

Schwellung der lingualen Seite der Epiglottis eines 65-jährigen Mannes. PEs.

Fall 14e

Klinische Angaben:

Schwellung der lingualen Seite der Epiglottis eines 65-jährigen Mannes. PEs.

Fall 15

Klinische Angaben:

Klinischer Karzinomverdacht bei einseitiger Schwellung der Gaumentonsille.
Tonsillektomie rechts, PEs aus Zungengrund links und rechts, Nasopharynx links und rechts.

Fall 15a

Klinische Angaben:

Klinischer Karzinomverdacht bei einseitiger Schwellung der Gaumentonsille.
Tonsillektomie rechts, PEs aus Zungengrund links und rechts, Nasopharynx links und rechts.

Fall 15b

Klinische Angaben:

Klinischer Karzinomverdacht bei einseitiger Schwellung der Gaumentonsille.
Tonsillektomie rechts, PEs aus Zungengrund links und rechts, Nasopharynx links und rechts.

Fall 15c

Klinische Angaben:

Klinischer Karzinomverdacht bei einseitiger Schwellung der Gaumentonsille.
Tonsillektomie rechts, PEs aus Zungengrund links und rechts, Nasopharynx links und rechts.

Fall 15d

Klinische Angaben:

Klinischer Karzinomverdacht bei einseitiger Schwellung der Gaumentonsille.
Tonsillektomie rechts, PEs aus Zungengrund links und rechts, Nasopharynx links und rechts.

Fall 16

Klinische Angaben:

Tumor in der Nasenhaupthöhle eines 85-jährigen Mannes. PEs.

Fall 17

Klinische Angaben:

Livid-rötlicher, leicht erhabener, weicher Hauttumor der Wange eines 83-jährigen Mannes mit zentraler seichter Exkoration. Exzision

Fall 17a

Klinische Angaben:

Livid-rötlicher, leicht erhabener, weicher Hauttumor der Wange eines 83-jährigen Mannes mit zentraler seichter Exkoration. Exzision

Fall 17b

Klinische Angaben:

Livid-rötlicher, leicht erhabener, weicher Hauttumor der Wange eines 83-jährigen Mannes mit zentraler seichter Exkoration. Exzision

Fall 17c

Klinische Angaben:

Livid-rötlicher, leicht erhabener, weicher Hauttumor der Wange eines 83-jährigen Mannes mit zentraler seichter Exkoration. Exzision

Fall 17d

Klinische Angaben:

Livid-rötlicher, leicht erhabener, weicher Hauttumor der Wange eines 83-jährigen Mannes mit zentraler seichter Exkoration. Exzision

Fall 17e

Klinische Angaben:

Livid-rötlicher, leicht erhabener, weicher Hauttumor der Wange eines 83-jährigen Mannes mit zentraler seichter Exkoration. Exzision