



INTERNATIONALE AKADEMIE FÜR PATHOLOGIE
DEUTSCHE ABTEILUNG e.V.
INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY
GERMAN DIVISION INC.

Klinische Angaben

Lehrserie Nr. 284

Endokrine Organe

von:

**A. Perren, CH-Bern, P. Komminoth, CH-Zürich,
2015 Update (Die Lehrserie steht
ausschließlich digital zur Verfügung)**

Fallanamnesen:

Fall 01

35-jähriger Patient mit einem 6cm grossen Knoten in der rechten Schilddrüse.

Fall 02

47-jährige Patientin mit einem 2cm grossen Knoten in der rechten Schilddrüse.

Fall 03

59-jährige Patientin mit einem 3cm grossen Knoten in der rechten Schilddrüse.

Fall 04

65-jährige Patientin mit einem 2,4cm grossen Knoten in der linken Schilddrüse.

Fall 05

22-jährige Patientin mit einem 4cm grossen Schilddrüsenknoten.

Fall 06

80-jährige Patientin mit bekannter Knotenstruma seit Jahren.

Seit 6 Monaten rasche zunehmende Grösse des rechten Lappens.

Fall 07

Patient mit unspezifischen Abdominalbeschwerden und gelegentlichem Blut im Stuhl.

Fall 08

55-jährige Patientin mit einem Tumor im Magenfundus.

Fall 10

48-jähriger Patient mit einem kleinen Knoten im Rektum.

Fall 11

24-jährige Patientin mit bekannter Colitis ulcerosa. Subtotale Kolektomie wegen einem exulzerierten 5cm grossen Tumor im linken Kolon.

Fall 12

68-jähriger Patient mit perforierter akuter Appendizitis.

Fall 13

64-jähriger Patient mit einem 7cm grossen Tumor im Pankreasschwanz, welcher nach neoadjuvanter Chemotherapie reseziert wurde.

Fall 14

60-jähriger Patient mit einem 23cm grossen Tumor am Oberpol der rechten Niere.
Keine hormonelle Symptomatik.

Fall 15

63-jährige Patientin mit einem 9cm grossen, zentral zystisch veränderten Tumor in der linken Nebenniere.

Keine hormonelle Symptomatik und unauffällige Steroidhormonspiegel.

Fall 16

43-jährige Patientin mit grösser gewordener tumoröser Masse der linken Schilddrüse.

In der FNP Diagnose einer follikulären Neoplasie. In der 35g schweren Hemithyreoidektomie findet sich eine unscharf begrenzte Neoplasie, welche praktisch den gesamten Schilddrüsenlappen einnimmt.

In der Schnellschnittuntersuchung Verdacht auf eine follikuläre Neoplasie.

Fall 17

13-jähriger Junge mit hypertensiven Krisen und einem 8cm grossen Tumor im Leberhilus.

Fall 18

25-jährige Patientin mit rezidivierenden Kopfschmerzattacken und einer 7cm grossen Masse in der rechten Nebenniere.

Fall 9A

Patienten mit Symptomen einer akuten Appendizitis.

Fall 9B

Patienten mit Symptomen einer akuten Appendizitis.