



INTERNATIONALE AKADEMIE FÜR PATHOLOGIE
DEUTSCHE ABTEILUNG e.V.
INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY
GERMAN DIVISION INC.

Klinische Angaben

Lehrserie Nr. 287

Gutartige und bösartige Tumore des Sinunasaltraktes: ausgewählte Entitäten

von:

**A. Agaimy, Erlangen, Annette Schmitt-Graeff,
Freiburg, 2015**

Fallanamnesen:

Fall 1b

Anamnese

Ein 52-jähriger Mann stellte sich in der HNO-Klinik wegen seit 2 Jahren bestehender Sinusitis-artiger Beschwerden vor. Es wurde eine Pansinus-Op. durchgeführt. Zwei Jahre später noch kein Rezidiv.

Makroskopischer Befund

Fragmentierte bröckelige und knotige polypöse zusammen 4,5 cm messende Proben. Die Präparate stammen aus 2 Blöcken vom selben Tumor.

Fall 6

Anamnese

Bei der 71-jährigen Patientin besteht eine derbe Induration an der Nasenseitenwand innen seit 6 Monaten. Es wurde nach HNO-ärztlicher Vorstellung eine lokale Exzision der tumortragenden Septumwand mit Knorpel. Ein anderweitiger Tumor oder Metastasen wurden bislang nicht festgestellt. Sie ist Rezidiv-frei 6 Monate nach Op.

Makroskopischer Befund

Ein 1,5 x 1 x 0,6 cm Exzissat mit einer flach polypösen ulzerierten Knoten von 6 mm. Schnittfläche hellbraun bis weißlich.